ИНСТРУКЦИЯ

ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

Валемидин®

Регистрационный номер: ЛП-№(009156)-(РГ-RU)

Торговое наименование: Валемидин®

Международное непатентованное или группировочное наименование: ~

Лекарственная форма: капли для приема внутрь спиртовые

Состав на	**25 мл**
Боярышника плодов настойка	4,2 мл
Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	8,3 мл
Дифенгидрамина гидрохлорид	0,025 г
Мяты перечной листьев настойка	4,2 мл
Пустырника травы настойка	8,3 мл

Описание: жидкость от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

Фармакотерапевтическая группа: психолептики; снотворные и седативные средства; другие снотворные и седативные средства.

Код АТХ: N05CM

Фармакологическое действие

Комбинированный препарат, действие которого обусловлено свойствами входящих в него веществ. Оказывает седативное и спазмолитическое действие.

Показания к применению

Невротические расстройства; нейроциркуляторная дистония по гипертоническому типу; нарушение сна, не связанное с органическими нарушениями центральной нервной системы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции почек и печени, артериальная гипотония, уменьшение частоты сердечных сокращений (менее 55 ударов в минуту), острая и хроническая сердечная недостаточность, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат применяется внутрь, за 30 минут до еды. Необходимое количество капель предварительно разводят в небольшом количестве воды.

При неврозах, нейроциркуляторной дистонии по гипертоническому типу принимают по 30-40 капель 3-4 раза в день. Курс лечения составляет 10-15 дней.

При нарушениях сна (в т.ч. при бессоннице) принимают по 40 капель 3 раза в день. Курс лечения составляет 15 дней.

Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача, но не ранее, чем через 1-1,5 месяца.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом. Применяйте препарат только согласно тем показаниям, тому способу применения и в тех дозах, которые указаны в инструкции по применению.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно развитие диспептических расстройств; при длительном применении – развитие сухости слизистых оболочек ротовой полости.

Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу.**

Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении Валемидина® с препаратами, угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные средства, транквилизаторы, нейролептики) возможно взаимное усиление эффектов.

Если Вы принимаете вышеперечисленные или другие лекарственные препараты (в том числе безрецептурные) перед применением препарата проконсультируйтесь с врачом.

Алкоголь усиливает эффекты препарата Валемидин® и может повышать его токсичность.

Особые указания

Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых (40 капель) составляет 0,58 г, в максимальной суточной дозе препарата для взрослых (160 капель) – 2,3 г.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Препарат содержит дифенгидрамина гидрохлорид и этанол. При применении препарата следует воздержаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в т. ч. управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами).

Форма выпуска

Капли для приема внутрь спиртовые.

25 мл во флаконе темного стекла с винтовой горловиной, укупоренном капельницей из полиэтилена высокого давления и крышкой с контролем первого вскрытия. На флакон нанесена этикетка самоклеящаяся. Один флакон вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачке картонной.

Срок годности

3 года.

Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Производитель

1. ООО «АВЗ С-П», 141305, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 (все стадии производства).

2. АО «Кировская фармацевтическая фабрика», 610000, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 А (все стадии производства).

3. ООО «Фармамед», Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 16, лит. Е (все стадии производства).

4. ООО «АВЗ С-П», 141305, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 (производство готовой лекарственной формы, первичная упаковка, вторичная/потребительская упаковка);

ООО «Фармамед», Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 16, лит. Е (выпускающий контроль качества).

5. АО «Кировская фармацевтическая фабрика», 610000, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 А (производство готовой лекарственной формы, первичная упаковка, вторичная/потребительская упаковка);

ООО «Фармамед», Россия, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сергиевское, ул. Домостроительная, д. 16, лит. Е (выпускающий контроль качества).

Держатель регистрационного удостоверения

ООО «Евромед», Россия, 140091, Московская область, г. Дзержинский, ул. Угрешская, д. 6, пом. 304.

Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «Фармамед», Россия, г. Санкт-Петербург, тел. (812) 647 02 46, сайт: valemidin.ru.