

ИНСТРУКЦИЯ
ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА
ВАЛЕМИДИН®

Регистрационный номер: ЛСР-000057

Торговое наименование: ВАЛЕМИДИН®

Лекарственная форма: капли для приема внутрь спиртовые.

Состав на

Валерианы лекарственной корневищ с корнями настойка	25 мл
Пустырника травы настойка	8,3 мл
Боярышника плодов настойка	4,2 мл
Мяты перечной листьев настойка	4,2 мл
Дифенгидрамина гидрохлорид (димедрол)	0,025 г

Описание: прозрачная жидкость от желтовато-коричневого до зеленовато-коричневого цвета с характерным запахом. При хранении допускается помутнение с последующим выпадением аморфного осадка.

Фармакотерапевтическая группа: седативное средство.

Код АТХ: N05CM.

Фармакологические свойства

Препарат обладает седативным, а также спазмолитическим действием.

Показания к применению

Препарат применяется у взрослых при неврозах, нейро-циркуляторной дистонии по гипертоническому типу.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, выраженные нарушения функции почек и печени, артериальная гипотония, уменьшение частоты сердечных сокращений (менее 55 ударов в минуту), острые и хроническая сердечная недостаточность, возраст до 18 лет (эффективность и безопасность не установлены).

С осторожностью

Алкоголизм, черепно-мозговая травма, заболевания головного мозга.

Применение при беременности и в период грудного вскармливания

Применение при беременности и в период грудного вскармливания противопоказано.

Способ применения и дозы

Препарат применяется внутрь у взрослых 3-4 раза в день по 30-40 капель, предварительно разведенных в небольшом количестве воды, за 30 минут до еды. Курс лечения составляет 10-15 дней. Проведение повторных курсов лечения возможно по рекомендации врача, но не ранее, чем через 1-1,5 месяца.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. В редких случаях возможно развитие диспептических расстройств; при длительном применении – развитие сухости слизистых оболочек ротовой полости. Если любые из указанных в инструкции побочных эффектов усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, **сообщите об этом врачу**.



Передозировка

При применении препарата в дозах, превышающих рекомендуемые, возможно усиление дозозависимых побочных эффектов. Лечение: симптоматическое.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

При одновременном применении ВАЛЕМИДИНА® с препаратами, угнетающими деятельность центральной нервной системы (седативные, снотворные средства, транквилизаторы, нейролептики) возможно взаимное усиление эффектов.

Особые указания

Препарат содержит димедрол и этанол, поэтому при применении ВАЛЕМИДИНА® следует воздерживаться от занятий потенциально опасными видами деятельности, требующими повышенного внимания и быстроты психических и двигательных реакций. Содержание абсолютного этилового спирта в максимальной разовой дозе препарата для взрослых (40 капель) составляет 0,58 г, в максимальной суточной дозе препарата для взрослых (160 капель) – 2,3 г.

Форма выпуска

Капли для приема внутрь спиртовые по 25 мл во флаконы из темного стекла с винтовой горловиной, укупоренные крышками с контролем первого вскрытия с капельницей. На флаконы наклеивают самоклеящуюся этикетку. Каждый флакон вместе с инструкцией по применению помещают в пачку из картона.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности

3 года

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.

Условия отпуска

Без рецепта.

Производитель

1. ООО «АВЗ С-П», 141305, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 (все стадии производства)

2. АО «Кировская фармацевтическая фабрика», 610000, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 А (все стадии производства)

3. ООО «АВЗ С-П», 141305, Россия, Московская обл., г. Сергиев Посад, ул. Центральная, д. 1 (производство готовой лекарственной формы, первичная упаковка, вторичная/потребительская упаковка)

ООО «Фармамед», г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16, лит. Е, лит. И (выпускающий контроль качества)

4. АО «Кировская фармацевтическая фабрика», 610000, Россия, Кировская обл., г. Киров, ул. Московская, д. 27 А (производство готовой лекарственной формы, первичная упаковка, вторичная/потребительская упаковка)

ООО «Фармамед», г. Санкт-Петербург, ул. Домостроительная, д. 16, лит. Е, лит. И (выпускающий контроль качества)

Организация, принимающая претензии от потребителей

ООО «Фармамед», тел. (812) 647 02 46, сайт: valemidin.ru

